

La CHJ y Territorio saben de la existencia del mejillón cebra en Forata desde hace semanas

Responsables de la confederación admiten que sus técnicos hallaron ejemplares de este molusco

Isabel Olmos, Valencia




Las dos administraciones con competencias para actuar contra el mejillón cebra sabían de su existencia en el embalse de Forata desde hace semanas pero no lo habían hecho público. Así lo confirmaron ayer a Levante-EMV altos responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quienes confirmaron que «técnicos de este organismo acompañados por biólogos de la Conselleria de Territorio», localizaron la presencia de este devastador molusco en el embalse de Yátova «hace varias semanas».



embalse de forata. Este espacio de Yátova se ha convertido en el segundo de la C. Valenciana con mejillón cebra.

Después de negar la mayor al ser preguntados el viernes por este periódico, 48 horas después, la CHJ ha confirmado lo que era un secreto a voces en la comunidad científica y este diario pudo comprobar in situ en la playa del embalse: la presencia del temible bivalvo. Fuentes del organismo quisieron dejar claro que la voluntad del mismo «no era esconder» la información sino un simple fallo de comunicación pero lo bien cierto es que a pesar del tiempo transcurrido desde que los técnicos de la CHJ y Territorio localizaran los ejemplares en Forata ninguna de las dos administraciones ha informado públicamente del hallazgo ni, por consiguiente, de las medidas de prevención a adoptar para evitar su propagación como prohibir la pesca o navegación en la zona afectada. Desde el embalse de Forata, el mejillón cebra puede desplazarse por el río Magro - que riega toda la zona del Marquesat (Catadau, Llombai, Alfarp o Alginet)-hasta el Júcar, y de allí al Turia o a la Albufera. Expertos consultados por este periódico no dudaban en afirmar que, en su opinión, la llegada de este pequeño Atila a los principales ríos valencianos es «cuestión de tiempo» y con él arribarán también importantes problemas por la obstrucción que hace de canalizaciones, tuberías o conducciones como las de agua potable. Hoy mismo, la CHJ tiene prevista una reunión para abordar, entre otras cuestiones, la aparición del mejillón cebra en Forata (actualmente también están presentes en el de Sitjar, en Castelló). «Las dos administraciones», explicaron ayer fuentes de la CHJ, «mantenemos una buena colaboración y los técnicos están trabajando juntos desde el primer momento, no entiendo a que viene eso». «Eso», es la postura hecha pública ayer por la Conselleria de Territorio en la que mostraba su «preocupación» por el mejillón cebra pero recordaba que las medidas las debe adoptar la CHJ en base a las competencias. Desde este organismo, no obstante, se apresuraron ayer a explicar que «es verdad que el embalse y el cauce son competencia nuestra, pero la biodiversidad, el contenido de esos cauces -los peces, moluscos, es responsabilidad de la Generalitat».

Servicios

-  Enviar esta página
-  Imprimir esta página
-  Atención al lector

[Anterior](#) [Volver](#) [Siguiete](#)